

## **Rapport de différentes expériences de traitement chez des enfants et adolescents avec TDAH (trouble de l'attention avec hyperactivité) [Article en anglais]**

Publié le 2011/10/04 par [joseeveilleladoc](#)

### **Treatment experiences of children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder.**

Leggett C, Hotham E. J Paediatr Child Health. 2011 Aug;47(8):512-7.

Les auteurs de cet article ont interviewé des parents d'enfants ainsi que des adolescents atteints du TDAH afin d'avoir leur opinion sur les différents traitements qu'ils ont utilisés ou utilisent présentement pour traiter les symptômes liés au TDAH de leurs enfants.

Avant de recevoir le diagnostic de TDAH les interventions par les parents ont été celles-ci : modification de la diète (46%), thérapie comportementale (24%), aide à l'apprentissage (8%) et remèdes naturels (8%). Après le diagnostic de TDAH les sujets ont tenté une moyenne de 2.8 interventions, soit : la thérapie expressive (48%), les thérapies basées sur la communication (48%) et les Oméga 3 (36%). Tous les sujets ont commencé une médication de psychostimulant après avoir reçu le diagnostic de TDAH. Malgré un taux de 52% des parents qui ont d'abord exprimés une réticence initiale envers les psychostimulants, 97% ont rapportés des expériences positives au niveau de l'école et des interactions sociales et familiales. Pour les sujets traités avec les psychostimulants d'autres traitements connexes ont été conservés (73%).

En conclusion, peu de patients utilisent la médication seule, la majorité des parents utilisent plusieurs approches pour gérer le comportement de leur enfant. Les parents essaient plusieurs variétés de thérapies avant de commencer la médication de psychostimulants, souvent à cause de peurs liées la sécurité des psychostimulants. Les parents sont généralement heureux des résultats obtenus, toutefois les adolescents interviewés sont moins convaincus des effets bénéfiques des psychostimulants. [trad. libre :jb]